

MIXAR MILK

Lactoreemplazante de leche de vaca apto para la crianza artificial de terneros. Provee a los terneros en su etapa de lactancia de todos los nutrientes necesarios para su normal crecimiento y desarrollo.

Composición nutricional	
Proteína bruta (mínimo)	21,0 %
Extracto etéreo (mínimo)	16,0 %
Humedad (máximo)	5%
Minerales totales (máximo)	8,0 %
Fósforo (mínimo- máximo)	0,8 - 0,9%
Calcio (mínimo- máximo)	1,0 - 1,2 %
Fósforo (mínimo- máximo)	0,8 - 0,9 %
Vitamina A (UI/kg)	32500
Vitamina D3 (UI/kg)	6500
Vitamina E (UI/kg)	90

Posibles ingredientes: leche en polvo entera, leche en polvo descremada, suero en polvo parcialmente desmineralizado concentrado de proteínas de suero de queso en polvo al 35%, harina de soja micronizada, núcleo vitamínico-mineral (vitaminas A, D₃ y E, C, B₁, B₂, B₆, B₁₂, K, ácido fólico, ácido pantoténico, ácido nicotínico, biotina, hierro, zinc, manganeso, cobre, selenio, yodo y cobalto), lisina, metionina, antioxidante, saborizante, colorante, coccidiostato.

Modo de uso: Mixar Milk se ofrece a los terneros desde el “calostrado” (primeros 2 a 5 días de vida) en adelante, hasta completar la etapa de cría.

Dosificación: Se utiliza 1 kilo de lactoreemplazante completando con 9 litros de agua potable para obtener los 10 litros de sustituto de leche. La dosis del lactoreemplazante puede variar dependiendo del plan de alimentación, época del año y edad de los terneros, etc.

Importante: Para una mejor dilución se recomienda calentar el 60 % de agua a 50- 55°C, agregarle el 100 % del producto, agitar hasta obtener una mezcla homogénea y luego completar con el total del agua restante. La temperatura ideal para ofrecer el sustituto a los terneros es de 37 a 39°C. Es muy aconsejable seguir las buenas prácticas de manejo en lo concerniente a la crianza de terneros. Respetar la temperatura de entrega y los horarios de alimentación diariamente. Se recomienda alimentar a los terneros al menos 2 veces al día con un mínimo de 2 litros en cada toma. Ante cuadro de diarrea, consultar al profesional veterinario, reducir la dosis de sustituto a la mitad, asegurando la provisión de agua para el ternero.

Dosis máxima admisible de acuerdo con la cantidad de ionóforo: 30 g de Mixar Milk / kg peso vivo / día.

Precauciones generales: No permitir el acceso de equinos u otros solípedos al alimento ya que el mismo contiene ionóforo. Su ingesta puede resultar fatal.

Periodo de carencia: No posee.

Presentación: Polvo. Bolsas de 25 kg.

Fecha Vencimiento: 6 meses desde fecha de elaboración. Proteger el producto del calor y la luz solar directa. Se aconseja el almacenamiento sobre tarimas para favorecer la conservación.

PRODUCTO REGISTRADO EN SENASA NRO. 15388/A